

# SPESSO LE CAUSE DI MAL DI SCHIENA INFIAMMATORIO SONO DIAGNOSTICATE TARDI

Il mal di schiena è cronico se dura più di **3 mesi**<sup>1,2</sup>



Circa **1** persona su **5** ha un mal di schiena lombare cronico<sup>1</sup>

In Europa, nella maggior parte dei casi, il mal di schiena è di tipo meccanico, ma in **circa il 3%** degli adulti è causato da un'**infiammazione**<sup>4</sup>




Per alcuni, il mal di schiena cronico è causato da un'**infiammazione**, che può iniziare in età giovanile, tipicamente **prima dei 40 anni**<sup>3</sup>

**40** anni<sup>3</sup>



**10** anni perché la causa del mal di schiena infiammatorio venga diagnosticata correttamente<sup>5</sup>



**1** persona su **3** affetta da una condizione che provoca mal di schiena infiammatorio lascia il lavoro a causa del suo stato di salute<sup>6</sup>

È noto che le condizioni che causano mal di schiena infiammatorio hanno un impatto sulla capacità di

**MUOVERSI GUIDARE RELAZIONARSI SOLLEVARE DORMIRE**

1. Airaksinen O, et al. European Guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. *Eur Spine J.* 2006; 15:S192-S300 2. Koes BW, et al. Diagnosis and treatment of low back pain. *BMJ.* 2006;332:1430-4 3. Sieper J, et al. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. *Ann Rheum Dis* 2009;68(Suppl.2): ii1-ii44. 4. Hamilton L, et al. The prevalence of inflammatory back pain in a UK primary care population. *Rheumatology (Oxford)* 2014;53:161-4. 5. Rudwaleit M, et al. Referral strategies for early diagnosis of axial spondyloarthritis. *Nat Rev Rheumatol.* 2012;8: 262-8. 6. Keat A, et al. BSR guidelines for prescribing TNF-alpha blockers in adults with ankylosing spondylitis. Report of a working party of the British Society for Rheumatology. *Rheumatology (Oxford).* 2005;44: 939-47. 7. Khan MA. 2002. *Ankylosing spondylitis - the facts.* Oxford: Oxford University Press.

Questa iniziativa è stata organizzata e finanziata da AbbVie con il supporto delle seguenti associazioni di pazienti

